

Outubro Rosa

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Gonorreia

É uma infecção transmissível comum, que afeta homens e mulheres.

É transmitida através do contato sexual, seja vaginal ou anal e sexo oral.

Mulheres grávidas com gonorreia podem transmitir para o bebê durante o nascimento.



Tratamento:

É uma doença tratável com antibióticos receitados pelo médico.

Além disso, prioriza-se que o parceiro sexual também vá a Unidade de Saúde para ser tratado.

Prevenção:

Uso correto e regular de preservativos;

Evitar práticas sexuais inseguras;

Diagnóstico e tratamento imediatos;

Identificação e tratamento de parceiros.

Sinais e Sintomas:

Costumam aparecer entre 2 e 14 dias após contato com os fluídos corporais do parceiro.

Em homens:

Desconforto na região peniana, dor e sensibilidade grave;

Dor escrotal unilateral com, sensibilidade e edema (inchaço);

Secreção purulenta.

Em mulheres:

Dor abdominal;

Secreção anal purulenta;

Lesões na pele;

Febre;

Náusea e Vômito.

Sífilis

É uma infecção transmissível através de contato sexual, em três estágios, que pioram progressivamente.

Mulheres grávidas podem transmitir sífilis para seu bebê.

Estágio Um:

Inicia-se no local exposto aos líquidos corporais do parceiro.

Percebe-se uma pequena área avermelhada e saliente; que torna-se uma ferida aberta indolor, dura e sem sangramento;

De três a doze semanas depois a ferida cicatriza.



Estágio Dois:

Inicia-se por uma erupção na pele indolor, se coceira, surgindo muitas vezes nas palmas das mãos e nas plantas dos pés;

Podem se formar verrugas salientes, planas e lisas nas áreas úmidas do corpo;

Febre, sensação de cansaço, linfonodos inchados.

Estágio 3:

Pode afetar a pele, vasos sanguíneos, coração, cérebro ou medula espinhal.

Dor torácica; dificuldade de respirar, ataque cardíaco;

Dor de cabeça; rigidez da nuca; alterações de humor; perda de sensação dos pés; dificuldade ao andar; dor nas costas; dor ou fraqueza braços ou pernas.

